

## PRZYGOTOWANIA DO BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

**Szanowni Państwo, w trosce o należyte przygotowanie do badania prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji i zaleceń:**

1. ZABRANIA SIĘ przyjmowania jakichkolwiek posiłków i płynów na 4 godzin przed badaniem TK.
2. Pacjent zgłaszający się na badanie TK musi mieć oznaczony poziom kreatyniny, który należy wykonać w laboratorium. Wynik powinien być aktualny i mieścić się w granicach normy. Za wynik aktualny uznaje się GFR wykonane do 3 dni przed badaniem.
3. Pacjenci z niewydolnością nerek, nadczynnością oraz niedoczynnością tarczycy powinni przed zarejestrowaniem się skontaktować się z pracownią tomografii komputerowej! Jeżeli poziom kreatyniny jest powyżej 2 – nie wykonujemy badań z kontrastem bez wyraźnej zgody specjalisty nefrologa.
4. W przypadku tomografii komputerowej jamy brzusznej na badanie należy przynieść 1,5 litra niegazowanej wody mineralnej. W dniu badania należy pozostać na czczo na 5 godzin przed badaniem. Pacjent zaczyna pić DOPIERO w gabinecie. Czas picia trwa od 1 do 1,5 godziny. Po upływie tego czasu pacjent ma wykonywane badanie. Zatem pacjent zgłaszający się na badanie TK jamy brzusznej i/lub miednicy powinien być świadomy czasu oczekiwania.
5. Przed badaniem TK nie należy przerywać stosowanego normalnie leczenia farmakologicznego.
6. Przed badaniem TK można ubrać się w wygodny, luźny strój, unikać metalowych dodatków takich jak zamki, guziki, klamry pasków, agrafki itp. Zdjąć spinki do włosów, biżuterię, okulary, aparaty słuchowe, niestałe protezy zębowe. Wszelkich informacji w tej kwestii udzieli osoba wykonująca badanie, ponieważ nie do każdego badania pacjent jest tak samo przygotowywany.
7. Prosimy o przyniesienie i przekazanie do wglądu posiadanej dokumentacji medycznej np. kart wypisowych leczenia szpitalnego, opisów poprzednio wykonanych badań TK z płytkami CD oraz wyniki RTG. Pacjenci powinni dokładnie znać nazwy i dawki przyjmowanych leków lub posiadać ich spis. Jest to bardzo istotne w przypadku badań z podaniem środka kontrastującego!
8. Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą.
9. Wyznaczona godzina badania może ulec przesunięciu ponieważ czas trwania zabiegów jest trudny do przewidzenia.
10. W razie wątpliwości i jakichkolwiek pytań można dzwonić do Pracowni TK

### UWAGA !!!

- Zalecane jest spożycie większej niż zwykle ilości płynów (do 2 litrów) po badaniu z kontrastem, aby przyspieszyć usunięcie kontrastu z krwi.
- Pacjentki w ciąży powinny koniecznie powiadomić o tym radiologa.
- Pacjentki karmiące piersią nie powinny karmić przez 24h po badaniu.

---

## INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE

### PRZED BADANIEM

- Rozpoznana wcześniej alergia lub wystąpienie w przeszłości jakichkolwiek reakcji uczuleniowych na leki lub środki kontrastowe.
- Wyniki wszystkich poprzedzających badań (w tym wyniki zwykłego badania radiologicznego).
- Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna) w przypadku stosowania dożylnych środków kontrastowych.
- Ciąża.

### W CZASIE BADANIA

Podczas badania TK pacjent, pomimo zamknięcia w hermetycznym pomieszczeniu, ma ciągłą możliwość wizualnego oraz głosowego kontaktu z badającymi. W czasie badania pacjent powinien natychmiast zgłaszać:

- Wszelkie nagłe dolegliwości (np. uczucie klaustrofobii).
- Jakiegokolwiek objawy po podaniu dożylnego środka cieniującego (duszność, zawroty głowy, nudności).